

الموضوع: بشأن التوصيات المتعلقة بالأجسام المضادة طويلة المفعول للأطفال

المحترمين

السادة/ أصحاب المنشآت الصحية

إشارة الى ما ورد الاتحاد من هيئة الصحة العامة "وقائية" خطاب رقم ٠٢٢٨٢٧-٤٦-١٠١ وتاريخ ٠٢ ربيع الأول ١٤٤٦هـ بشأن قيام الهيئة بدراسة التدخلات الوقائية للأمراض المعدية التالية: فيروس المخلوي التنفسي وجذري القردة وكوفيد-١٩ ، وبناءً على ذلك فقد أوصت بما يلي:

الموضوع: التوصيات المتعلقة بالأجسام المضادة طويلة المفعول (Niesevimab) للأطفال:

أولاً: نظراً إلى عبء مرض الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) على الأطفال وتأثيراته على النظام الصحي، فإن الهيئة توصي باستخدام الجسم المضاد طويل المفعول (Niesevimab) للوقاية من مضاعفات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي في حال توفره، وذلك بحسب الأولوية للفئات التالية:

الفئة الأولى: الأطفال من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض والذين تقل أعمارهم عن ٨ أشهر ويدخلون أو يولدون خلال موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأول لهم والأطفال من الفئات التي مازالت تعتبر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض والذين تتراوح أعمارهم بين ٨ إلى ١٩ شهراً ويدخلون موسمهم الثاني للفيروس المخلوي التنفسي (بحسب الجدول الموضح أدناه).

الفئة الثانية: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ أشهر ويدخلون أو يولدون خلال موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأول لهم ويصعب عليهم- في حال إصابتهم- الوصول إلى المنشآت الصحية التي تقدم الخدمات الصحية اللازمة لعلاج حالات الفيروس التنفسي المخلوي.

الفئة الثالثة: جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ أشهر ويدخلون أو يولدون خلال موسم الفيروس المخلوي التنفسي الأول لهم.

الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض والذين تقل أعمارهم عن ٨ أشهر (الموسم الأول)	
الطفل المولود أقل من (٢٩) شهر أسبوع حملي	الطفل الذي يعاني من مرض الرئة المزمن
الطفل الذي يعاني من أمراض القلب الخلقية	متلازمة داون
الطفل الذي يعاني من اعتلال الرئتين أو الجهاز العصبي ولا يستطيع التخلص من البلغم أو يعاني نقص المناعة الشديد	
الفئات التي ما زالت تعتبر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض والذين تتراوح أعمارهم بين ٨ إلى ١٩ شهراً (الموسم الثاني)	
الطفل الذي يعاني من مرض الرئة المزمن	الطفل الذي يعاني من أمراض القلب الخلقية
الطفل الذي يعاني من اعتلال الرئتين أو الجهاز العصبي ولا يستطيع التخلص من البلغم أو يعاني نقص المناعة الشديد	

ثانياً: حسب البيانات المتوفرة فإن الموسمية فيروس المخلي المحلي تبدأ من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس، مع بلوغ الذروة في شهري ديسمبر ويناير، لذا فإن الهيئة توصي ببدء التحصين قبل دخول الموسم بأسبوعين حتى نهايته.

ثالثاً: في حال عدم تمكن من توفير الجسم المضاد طويل المفعول (Niesevimab) ، فإن الهيئة توصي بأهمية استمرار العمل بالتوصيات والممارسات السابقة لاستخدام المضاد (Palivizumab).

رابعاً: في حال تلقي أم الطفل لقاح فيروس المخلي التنفسي الخاص بالحوامل (RSVpreF) أثناء حملها وتمت الولادة بعد ١٤ يوم من تاريخ أخذ التطعيم، فإن الهيئة توصي بعد الحاجة لإعطاء الطفل الجسم المضاد طويل المفعول (Niesevimab) في الموسم الأول.

الموضوع: التوصيات المتعلقة بالفئات عالية الخطورة المستهدفة بلقاح كوفيد-١٩ المطور؛

أولاً: توصي الهيئة بإعطاء جرعة من لقاح كوفيد -١٩ المطور لكل من الفئات عالية الخطورة الموضحة أدناه إذا مضى على تحصينهم ٦ أشهر فأكثر؛

-الفئة العمرية أكبر من ٥٠ سنة.

-الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة (السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الرئة المزمنة، أمراض الكلى، أمراض الكبد ، أمراض نقص المناعة) أو سمنة مفرطة.

-الحوامل.

-العاملين الصحيين.

ثانياً: نرى أهمية إعطاء لقاح كوفيد -١٩ المطور للفئات الموضحة أعلاه بأحدث تركيبة في حال توفرها واعتمادها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

الموضوع: التوصيات العلمية حول استخدام اللقاحات في الوقاية من جدري القردة:

توصي الهيئة بالاستمرار باستخدام لقاح الجيل الثالث لمرض الجدري (JYNNEOS) للوقاية من مرض جدري القردة (Mpox)، وتم تضمينه في الدليل الاسترشادي لمرض جدري القردة للممارسين الصحيين، يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط الموضح ادناه.

وعليه فإن على المنشآت الصحية العمل على تطبيقها.

- <https://www.pha.gov.sa/ar-sa/EvidenceAndProcedures/Documents/AR%20Quick%20Interim%20Guidelines%20for%20Mpox.pdf>
- [https://www.pha.gov.sa/ar-sa/EvidenceAndProcedures/Documents/Quick%20Interim%20Guidelines%20for%20Mpox%20\(Monkeypox\).pdf](https://www.pha.gov.sa/ar-sa/EvidenceAndProcedures/Documents/Quick%20Interim%20Guidelines%20for%20Mpox%20(Monkeypox).pdf)

وتقبلوا اطيب التحية و التقدير ،،

إدارة تقنية المعلومات