

الموضوع: نشر التقرير الدبلوماسي الاثيوبي

المحترمين

السادة/المنشآت الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى خطاب هيئة الصحة العامة "وقاية" رقم ٠٠٧٧٨١-٤٧-١٠١ وتاريخ ٢٠ محرم ١٤٤٧هـ، والمشار فيه إلى قيام الهيئة بدراسة التدخلات الوقائية للأمراض المعدية التالية المكورات النيسيرية السحائية وفيروس المخلي التنفسي وفيروس الانفلونزا، وتوصي بما يلي:

أولاً/ التوصيات المتعلقة بلقاح المكورات السحائية من المجموعة المصلية بـ (MenB)؛

توصي الهيئة بإعطاء لقاح المكورات النيسيرية السحائية من المجموعة المصلية بـ (MenB) لفئات محددة معرضة لخطر الإصابة بسبب حالتهم الصحية أو بسبب تزايد خطر تعرضهم للميكروب والتي تشمل الآتي:

-المرضى الذين يعانون من نقص أو غياب مكونات الجهاز المكمل (Complement Deficiency).

-المرضى الذين يخضعون لعلاجات مثبطة لمكونات الجهاز المكمل (Complement inhibitors) مثل إيكوليزوماب (eculizumab) أورافوليزوماب (Ravulizumab).

-الأطفال بعد التعافي من مرض التهاب السحايا النيسيرية وذلك بعد تقييمهم من قبل الطبيب المعالج.

-العاملين الصحيين في المختبرات الذين يتعاملون مع عزل المكورات السحائية النيسيرية.

-الأشخاص المعرضي للإصابة أثناء حدوث تفشي للمكورات السحائية النيسيرية المجموعة المصلية ب.

كما توصي بإعطائهم ثلاث جرعات من اللقاح للفئات الموضحة أعلاه، الجرعة الثانية بعد شهرين من الجرعة الأولى والجرعة الثالثة بعد ستة أشهر، مع إمكانية إعطاء جرعات تنشيطية بحسب تقييم الطبيب المعالج لكل حالة.

اسم اللقاح : (4CMenB) للفئة العمرية شهرين فأكثر، (MenB-FHBP) للفئة العمرية عشرة سنوات فأكثر.

ثانياً/ فيما يخص التوصيات المتعلقة بلقاحات الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) للبالغين الأكبر سناً؛

توصي الهيئة بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية ٦٠ عام وأكبر ولديهم إحدى عوامل الخطورة الموضحة أدناه بلقاح الفيروس التنفسي المخلوي بجرعة واحدة إذا لم يتلقوا اللقاح من قبل وذلك للفئات التالية؛

-أمراض القلب المزمنة (مثل فشل القلب).

-أمراض الكلى المزمنة.

-مرض السكري.

- أمراض الكبد المزمنة (مثل تلف الكبد).

-سكان مرافق الرعاية طويلة الأجل.

-أمراض الرئة أو جهاز التنفسي المزمنة (مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو).

-حالات ضعف المناعة المتوسطة إلى الشديدة.

-أمراض الدم المزمنة (مثل الانيميا المنجلية والثلاسيميا).

-السمنة المفرطة (مؤشر كتلة الجسم ك ٤٠ كجم/م^٢).

-جميع البالغين بعمر ٧٥ سنة وأكبر.

-الأمراض العصبية أو الاضطرابات العصبية العضلية التي تؤثر على مجرى التنفس أو عضلات الجهاز التنفسي.

كما نوصي بتطعيم الأشخاص في الفئة العمرية ٥٠ إلى ٥٩ سنة ولم يتلقوا اللقاح من قبل ولديهم إحدى عوامل الخطورة المشار إليها أعلاه بناءً على تقييم وتوصية الطبيب المعالج.

ثالثاً/ التوصيات المتعلقة بلقاح الإنفلونزا الثلاثي ومقارنته بلقاح الإنفلونزا الرباعي؛

توصي الهيئة بأفضلية استخدام لقاح الإنفلونزا الثلاثي بدل من لقاح الإنفلونزا الرباعي، وذلك نظراً لعدم رصد سلالة Yamagata عالمياً أو محلياً ولعدم ارتباطها بتفشيات مؤكدة لفيروس الإنفلونزا، وكما توصي بأفضلية استخدام لقاح الإنفلونزا الثلاثي عالي الجرعات للأشخاص في الفئة العمرية ٦٥ سنة وأكبر بدل من لقاح الإنفلونزا عالي الجرعات الرباعي ، مع أهمية استمرار تقييمهما سنوياً نظراً للطبيعة المتغيرة لسلالات الإنفلونزا واستناداً إلى مستجدات بيانات الترصد الوبائي المحلي والعالمي.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير ،،

إدارة تقنية المعلومات